



[Portada](#)

[Galerías de Fotos*](#)

[Mi país*](#)

[Mapa del sitio*](#)

[5 Héroe*s*](#)

[Contáctanos*](#)

[Amigos*](#)

Sexualidad y salud



[¿Quiénes somos?](#)



[Vida Estudiantil](#)
[Sexualidad y Salud](#)
[Deporte](#)
[Así Somos](#)
[Arte](#)
[Ciencia y Tecnología](#)
[Tiempo Libre](#)
[Humor](#)
[Moda](#)
[Tus canciones](#)
[Por el mundo](#)
[Rollo Joven](#)

Sexo prematuro duplica riesgo de cáncer cervical

Practicar relaciones sexuales a edad temprana duplica el riesgo de desarrollar cáncer cervical o de cuello uterino, afirma una investigación publicada en la **British Journal of Cancer** (Revista Británica de Cáncer).

Por [Miriam Zito](#)



Un estudio internacional que analizó por qué las féminas en los países de bajos y medianos ingresos tienen más riesgo de sufrir de cáncer cérvico-uterino, demostró que tienden a tener relaciones sexuales cuatro años antes que las mujeres en países de altos ingresos.

Edición de papel

Cada año fallecen unas 300 mil en el mundo debido a esa afección, y 80 por ciento de esa cifra reside en naciones subdesarrolladas.



Perfectamente prevenible, la patología, que afecta la parte baja del útero, es causada por una infección con el [Virus del Papiloma Humano \(VPH\)](#).

[Editora Abril](#)
[Pionero](#)
[Zunzún](#)
[Juventud Técnica](#)
[Alma Máter](#)
[Caimán Barbudo](#)

Realizado en casi 20 mil mujeres por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el estudio confirmó que las tasas más altas de cáncer cervical no están vinculadas a los niveles más elevados de infección de VPH, pero sí a las mujeres con una situación socioeconómica inferior, ya que suelen iniciar relaciones sexuales más temprano.

La edad en la que se tiene el primer bebé también es un factor importante, afirman los investigadores.

Los resultados no se restringen a la adolescencia, sino al tiempo que una mujer ha sido sexualmente activa. Si su primera relación sexual ocurrió a los 20 años, tiene mayor tendencia a desarrollar el mal en comparación con otra que la inició a los 25.

Por lo general se necesitan varios años para que las células del cuello uterino se tornen cancerígenas, y la única forma de detectar las anormales es la prueba denominada Papanicolaou, en la que se analizan bajo el microscopio.

Actualmente no hay un tratamiento efectivo para combatir la infección de VPH, pero en los países desarrollados ya se dispone de una vacuna profiláctica que podría ser la forma más eficaz de prevenir el mal.

[Subir](#)

[Los Cinco](#)

