

[Portada](#)

Del 16 al 22 de julio de 2015

[¿Quiénes Somos?](#) | [Escribenos](#) | [Correspondencia](#) | [ISSN 1729-3812](#)[Galería de Fotos](#)[Dossier Especial](#)[Noticias anteriores](#)[Sugerimos...](#)[Con la FMC](#)[Protagonista](#)[Quehaceres](#)[Criterios](#)[Reflexiones](#)[Hablemos francamente](#)[En familia](#)[Salud](#)[Cultura](#)[Deportes](#)[Globalicemos la  
solidaridad](#)[La mujer en el mundo](#)[Mujeres con historia](#)[Famosas en La Habana](#)[Eventos](#)[Mil ideas](#)[Comer y beber a la  
cubana](#)[La página verde](#)

## Sugerimos...

### Adicción y mortalidad fetal

Por [Doctor Alberto Quirantes Hernández\\*](#)

Hay muerte fetal cuando el producto del embarazo fallece dentro del útero pesando más de 500 gramos y con una gestación de más de 22 semanas. O sea, se ha desarrollado de tal forma que en condiciones adecuadas la vida fuera del útero hubiera sido posible.

Cuando un feto nace muerto es llamado mortinato. La mayoría de estos eventos ocurren en el tercer trimestre de embarazo. Las mujeres fumadoras de marihuana pueden triplicar las posibilidades de parir un mortinato, según se demuestra en una reciente investigación.

#### UN ELEVADO RIESGO

Este riesgo aumenta aún más si la embarazada se expone a la marihuana en combinación con otras sustancias tóxicas. Lo cual fue comprobado en una investigación desarrollada por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos y publicada en la revista *Obstetrics & Gynecology*.

Fueron analizados 663 partos de mortinatos y comparados con mil 900 nacimientos de niños vivos. Se investigó la sangre del cordón umbilical y de las madres en busca de diferentes drogas ilegales.

En el 94 por ciento de los mortinatos analizados se encontraron resultados positivos para una o más de una droga ilegal. La más común fue la marihuana, asociada con un aumento de 2,8 veces en los fetos nacidos muertos.

Las razones de los posibles mecanismos del aumento del riesgo de muerte fetal debido al empleo de la marihuana aun no se encuentran esclarecidas. Pero sí queda confirmado un mayor riesgo debido a esta peligrosa droga.


A veces el peligro es compartido con la adicción al tabaco pues el hábito de fumar o incluso el humo de segunda mano también se asocia con fallecimientos dentro del útero.

#### UNA RECOMENDACIÓN OPORTUNA

Por lo tanto, es muy aconsejable para todos y en especial a todas las mujeres



#### Otros vínculos

[Masculinidades en cuba](#)[NO a la violencia contra la Mujer](#)[Observatorio](#)[Directorio  
Prensa](#)

cuando estén planificando quedar embarazadas o ya lo estén, nunca usar ningún tipo de drogas, en particular la marihuana, no beber nada de alcohol, no fumar y no exponerse al humo de segunda mano, como parte de una adecuada estrategia para tener un parto y una vida feliz.

\*M.Sc. Dr. Alberto Quirantes Hernández Master en Ciencias y Profesor Consultante Jefe del Servicio de Endocrinología Hospital Docente “Dr. Salvador Allende” La Habana – Cuba

Tomado de <http://www.radiococo.icrt.cu/2014/02/22/marihuana-y-mortalidad-fetal/>

---

**Publicado: 25/6/2015**

[Escribenos](#) | [Correspondencia](#) | [Galería de Fotos](#) | [Dossier Especial](#)